

REUMA ja INFLUENSSAROKOTUS

Reumapotilailla, joilla on reuman hoitona sytostaattilääkitys (Arava, Trexan, Methotrexate, Leukeran Syklofosamid, Azamun, Imurel) sekä Sandimmun kuuluvat influenssarokotusten riskiryhmään sekä myös ne reumapotilaat, joilla on biologinen reumalääkitys (Humira, Enbrel, Remicade, Oencia, RoActemra, Mabthera, Kineret, Cimzia, Simponi).

Influenssarokotuspäivänä ei saa ottaa Trexania.

Influenssarokotteen voi pistää biologisen lääkkeen pistämisen/infuusion puolivälissä.

- Kineret -pistos: päivittäin
- Enbrel -pistos: viikon välein
- Humira, Cimzia –pistos: 2 viikon välein
- Oencia -infuusio, RoActemra -infuusio, Simponi -pistos: 4 viikon välein
- Remicade -infuusio: 8-10 viikon välein
- Mabthera -infuusio: erillisen ohjeen mukaan (yleensä kerran vuodessa)

Influenssarokotuksen voi pistää samana päivänä Myocrisin-injektion (kulta) kanssa.

Lapsireumapotilaat saavat tarkemmat influenssarokotuksen pistosohjeet K-SKS lastenpkl:lta tai muusta hoitovastuupaikasta.

Hyväksytty:

Päivittäjä:

Päiväys:

Anne Nummela, reumahoitaja

30.10.2014